

## Patientforløb og ydelser

### 1. henvendelse vedr. allergisymptomer. (Læge eller sgpl.)

Kort snak om symptomer, sæson? Rhinitis , øjne, udslæt astma eller krydsallergier?

Bestil RAST test under allergi : "Rhinitis-konjunktivitis-astma" – husk at der gerne må tages antihistaminer 3 dage inden.

MEN LFU med reversibilitet skal laves uden antihistamin i 3 dage. Så må evt. udskydes hvis pt. Ikke kan undvære dem.

**Ydelse: 0101 + lab**

### 2. henvendelse (sygeplejerske):

Dybere udspørgen til anamnesen, allergener, symptomer hyppighed, tidl. Brugt medicin, astma symptomer, krydsallergier.

- VAS scoring. Blåt skema. Astma eller mulig astma?
- Svar RAST-test, passer det med symptomer?
- Bestil LFU med reversibilitet.
- Mål peakflow, bedst af 3 forsøg – noteres i journal.
- Initier nødvendig behandling.. :
  - Tablet antihistamin, næsespray med steroid eller evt. antihistamin.
  - øjendråber (antihistamin, evt. cromoglycaner),
  - Inhalator hvis relevant astma (SABA, ICS, evt. ICS/LABA)

**Ydelse: 0101+7183**

### 3. henvendelse:

- LFU med reversibilitet

**Ydelse: 0101 + 7121 + 7183**

### 4. Henvendelse:

Gennemgang af behandlingseffekt (Læge eller sgpl.)

VAS score: 1-2 velbehandlet, 3-5 optimer, 5-10 insufficient behandlet.

Overvej differentieldiagnoser, optimer behandling.

Overvej om pt. er kandidat til SCIT/SLIT behandling.

Planlæg kontrol – evt. ved sygeplejerske

**Ydelse: 0120**

Kodning: R00 – luftveje + t784 Allergi uden specifikation

Evt. kontrol igen efter dette.

Ved vedvarende VAS 5-10 overvej immunterapi. Konfereres med læge.